

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

MIGNOLATURA

PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE,
EUZOPHERA,
CONCIMAZIONE,
POTATURA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

16-05-2025

Prossimo bollettino 30-05-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Anche in queste settimane il tempo è stato variabile, con alcuni fenomeni temporaleschi. Nonostante ciò, le temperature rimangono piuttosto elevate. **Tutte le varietà sono in pieno sviluppo vegetativo. La fase fenologica osservata è quella dell'allungamento dei bottoni fiorali nelle zone a microclima più fresco, mentre nelle zone a microclima più caldo si riscontra già una piena mignolatura.**

Si rileva la presenza sporadica di alcuni fitofagi secondari, ma attualmente non si rilevano danni.

Continua a essere segnalata la **presenza di larve e crisalidi di Euzophera spp** soprattutto sulla varietà Casaliva. Nelle ultime settimane, il clima caldo-umido e la persistente bagnatura fogliare hanno creato **condizioni ottimali per lo sviluppo di patologie fungine**, in particolare dell'**occhio di pavone (Spilocaea oleaginea)**. La malattia risulta particolarmente diffusa negli oliveti dove non sono stati effettuati interventi fitosanitari.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile eseguire una **concimazione fogliare con urea a basse concentrazioni (1,5-2%)**, che consente un assorbimento rapido ed efficiente da parte della pianta, si ricorda **evitare di intervenire in caso di piante molto vigorose**, poiché si potrebbero creare condizioni di squilibrio che andrebbero a **favorire** lo sviluppo vegetativo (**polloni e succhioni**) e quello delle patologie fungine.

Per gli olivicoltori che operano in regime biologico esistono concimi fogliari biologici specifici per gli olivi.

Negli oliveti con carenza cronica di boro, è possibile intervenire con un'applicazione fogliare di prodotti a base di boro. A questi possono essere abbinati anche i concimi azotati fogliari, sopra accennati.

Questo consente di correggere la carenza del microelemento e, se necessario, fornire un apporto supplementare di azoto in modo efficiente.

Concludere le potature.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Visto le condizioni favorevoli alle malattie fungine si consiglia di trattare:

In CONVENZIONALE eseguire un trattamento con fungicidi contro **occhio di pavone attivi anche sulle infezioni latenti di lebbra dell'olivo** a base di (tryfloxystrobine, tebuconazolo in alternativa piraclostrobina)* il trattamento è abbinabile alle concimazioni fogliari, già menzionate.

In BIOLOGICO si **consiglia di sospendere i trattamenti a base di RAME** sarà possibile intervenire dopo la fioritura.

*si raccomanda sempre di rispettare i tempi di rientro in campo e le dosi indicate in etichetta

CONSIGLI D'INTERVENTO



Sintomi di boro carenza



Foglie attaccate da occhio di pavone



Deperimento di una branchetta di olivo causato da un attacco di Euzophera

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo: **-allungamento delle mignole**

I **rovesci temporaleschi** degli ultimi giorni **potrebbero favorire le infezioni primarie di occhio di pavone** soprattutto negli **areali con scarsa ventilazione**. Si segnala **la presenza** di **Euzophera spp.** in oliveti con piante di frantoio già infestate da rogna.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Terminare le operazioni di potatura e rimuovere i residui di potatura in tempi rapidi.

Si raccomanda di non **lasciare i residui di potatura in campo**, poiché possono **essere fonte d'inoculo per la diffusione di alcuni insetti dannosi per l'olivo**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Concludere i trattamenti rameici di post potatura. È **possibile eseguire un'integrazione del Boro** tramite una concimazione fogliare, il Boro è un microelemento molto importante che è coinvolto nella fertilità dei fiori. In caso di **attacchi severi di occhio di pavone** si consiglia di **intervenire con prodotti curativi (triazoli, strobilurine)** si può anche eseguire un **trattamento con prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo dodina**, al fine di evitare fenomeni di filloptosi di grossa entità, o in alternativa, **nel biologico**, è possibile effettuare **un intervento a base di ossicloruro di rame**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica- areale Sebino



Fase fenologica- areale Sebino



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **allungamento mignole.**

Le piante si stanno avvicinando al periodo della **fioritura** e anche negli **areali meno precoci** si possono vedere le **mignole in allungamento**. L' elevata umidità dell'anno scorso e le piogge di quest'anno stanno favorendo le condizioni di **sviluppo per l'OCCHIO DI PAVONE**, specialmente in quei campi dove il trattamento rameico o anticrittogamico non è stato effettuato dopo la raccolta.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase **è ancora possibile procedere con le potature**. Vista la presenza delle mignole in pianta, è più facile **identificare la chioma produttiva, che dovrà essere il più possibile tutelata**, continuando a rispettare il gradiente conico sulle branche primarie.

È opportuno **effettuare trattamenti di concimazione fogliare** laddove vi fossero **carenze specifiche**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Se non fossero ancora stati fatti, **questi sono gli ultimi giorni utili per effettuare trattamenti rameici** contro **occhio di pavone**. Nel caso si raccomanda **l'utilizzo di ossicloruro di rame a basse concentrazioni**, stando attenti a **non avvicinarsi troppo alla fioritura**, così da non rischiare effetti collaterali di fitotossicità.

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>