

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

ACCRESIMENTO
FRUTTO

PAROLE CHIAVE:

INIZIO CASCOLA
PATOLOGICA, CIMICE
ASIATICA

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

26-06-2025

Prossimo bollettino 11-07-2025

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Persistono ancora temperature elevate sopra la media stagionale con giornate soleggiate che sono state interrotte da qualche fenomeno temporalesco. Dal punto di vista fenologico, nella maggior parte degli oliveti siamo in accrescimento del frutto. Per i fitofagi secondari **si registrano** alcune **rosure di Margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci la sporadica presenza di **Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **Cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*) entrambi **non destano preoccupazione e non richiedono interventi**.

Si segnala aumento di **Cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*) e l'inizio dei sintomi di cascola soprattutto nelle **zone del basso Garda**, mentre per la **situazione** è ancora **stazionaria in Valtenesi e Alto Garda**.

Le temperature elevate e le precipitazioni contenute non stanno favorendo le malattie fungine come occhio di pavone che con questo clima si trovano bloccate nel loro sviluppo.

Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link: <https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202025.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Arrivando il periodo in cui potrebbe essere necessario intervenire contro gli insetti fitofagi **si consiglia per tutelare gli insetti pronubi (api e apoidei)**, fondamentali per l'impollinazione e la biodiversità, di **adottare strategie fitosanitarie e gestionali che ne riducano l'esposizione ai trattamenti insetticidi**.

Prima dell'applicazione, in caso di fioriture, è opportuno **effettuare lo sfalcio della vegetazione**, preferibilmente in ore serali o mattutine, quando l'attività di volo degli apoidei è assente. Inoltre, è cruciale **limitare la deriva dei prodotti fitosanitari**, evitando la contaminazione di siepi fiorite, colture marginali e flora spontanea adiacente all'area trattata.

Controllare lo stato idrico dei **nuovi impianti** e degli impianti giovani e se necessario intervenire con una irrigazione di soccorso.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica- areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

I monitoraggi hanno restituito una situazione eterogenea per quanto riguarda la popolazione di **cimice asiatica**. Negli oliveti del Basso Garda **la popolazione di cimice asiatica risulta essere in aumento e si sono rilevati i primi sintomi di cascola patologica. Si consiglia agli olivicoltori di questa area di monitorare la situazione in campo e in caso di presenza dell'insetto di procedere ad un trattamento.** Nelle altre località gardesane (Valtenesi e alto Garda) si è rilevata una popolazione di cimice stazionaria e in alcuni casi molto bassa o non ancora presente. Si consiglia comunque agli olivicoltori di monitorare la presenza dell'insetto in campo poiché in alcuni casi la situazione può variare da località a località entro lo stesso comune.

Si raccomanda a tutti gli olivicoltori gardesani dopo il riscontro del monitoraggio di **prepararsi a un eventuale intervento**, qualora la popolazione dell'insetto aumenti ulteriormente.

Si ricorda che il **periodo d'intervento** per la lotta a cimice asiatica in oliveto è tra lo stadio di **olive con dimensioni di grano di pepe e l'indurimento del nocciolo**, in presenza di adulti e/o neanidi.

Al momento, gli unici principi attivi registrati contro la *cimice asiatica* (*Halyomorpha halys*) e utilizzabili su olivo sono la **deltametrina** e il **piretro naturale**. Altri prodotti che contengono il p.a. Acetamiprid e registrati su olivo per Mosca (*Bactrocera oleae*), Tignola (*Prays oleae*), Sputacchina (*Philaenus spumarius*) e Cecidomia fogliare dell'olivo (*Dasineura oleae*) hanno un'azione collaterale anche su cimice asiatica ma non sono registrati per questo fitofago.

Date le **prime rosure di margaronia**, si consiglia agli olivicoltori che abbiano impianti giovani di controllare la situazione e in caso di rosure diffuse procedere con un trattamento con prodotti a base di *B. thuringiensis*.


TRATTAMENTI CIMICE ASIATICA	
CONVENZIONALE	Prodotti a base di Deltametrina
BIOLOGICO	Prodotti a base di Piretrine naturali *
TRATTAMENTI MARGARONIA	
In oliveti giovani	Prodotti a base di B.thuringiensis (da riperete a distanza di 7-10 gg)
In oliveti produttivi	I trattamenti per cimice asiatica hanno un' azione collaterale controllando la popolazione di questo fitofago

*si consiglia di acidificare la soluzione durante la preparazione della miscela.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Neanide di terza età di cimice asiatica-areale Garda



Rosure di margaronia - areale Garda



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **accrescimento dei frutti**

Si segnalano i primi rilevamenti di adulti, neanidi di 1° e 2° età e ninfe di 1° età di cimice asiatica **associati a cascola verde** soprattutto **su oliveti limitrofi a frutteti, orti e abitazioni**.

Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202025.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Sfalciare o trinciare l'erba in oliveto e **programmare un intervento fitosanitario** in caso **di diffusa presenza di cascolare verde e/o esemplari di cimice asiatica**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si suggerisce di effettuare un **trattamento abbattente** nei confronti di **Halyomorpha halys** solamente in presenza di esemplari di cimice asiatica, nel caso ci fosse la necessita di effettuare un trattamento antifungino alla miscela possono essere aggiunti anche prodotti fitosanitari a base di rame.

Ricordiamo di eseguire gli **interventi nelle ore più fresche della giornata**, rispettare le **prescrizioni riportate in etichetta**. **Contattare il tecnico prima di effettuare interventi fitosanitari.**

TRATTAMENTI CIMICE ASIATICA	
CONVENZIONALE	Prodotti a base di Deltametrina
BIOLOGICO	Prodotti a base di Piretrine naturali

CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

Fase fenologica: **accrescimento dei frutti**

In questa fase cominciano le operazioni di difesa fitosanitaria contro i parassiti principali dell'olivo nei nostri areali. In campo si rileva la **presenza di cimice asiatica e margaronia**. È fondamentale in questo periodo effettuare dei montaggi settimanali per valutare la presenza o meno dei parassiti. Le infestazioni di margaronia non sono ancora tali da giustificare un trattamento ad hoc, se non nei casi in cui bisogna difendere un giovane impianto.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase, dove **non** è possibile **effettuare trattamenti**, si raccomanda di **sfalciare i campi**, per favorire la prontezza d'intervento con un trattamento abbattente in caso di infestazioni da cimice.

CONSIGLI AGRONOMICI

Se le **infestazioni di cimice sono oltre la soglia d'intervento** (la procedura di campionamento e il rilevamento delle soglie sono spiegate nella scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link: <https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202025.pdf> , si consiglia di **intervenire** con un **trattamento di tipo abbattente con deltametrina (per la difesa integrata) o con piretro (per la difesa biologica)**. Questi trattamenti vanno eseguiti durante le ore serali, per evitare danni sull'entomofauna utile. Per quanto riguarda il piretro si consiglia di acidificare la soluzione durante la preparazione della miscela.

In caso di un **attacco di margaronia in giovani impianti** è consigliato effettuare un **trattamento serale** a base di **Bacillus thuringensis**, anche qui, previa acidificazione della soluzione.

CONSIGLI D'INTERVENTO





CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che la **CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

DEROGA

Si comunica alle aziende che aderiscono (**ex misura 10**) all'intervento **SRA01 del PSP 2023-2027**, all'Operazione **10.1.01 del PSR 2014-2022**, che aderiscono al **Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata (SQNPI)** che su richiesta di AIPOL, **regione Lombardia** ha espresso parere positivo all'utilizzo in deroga alle **Norme tecniche di difesa e diserbo anno 2025 per la difesa dell'olivo**:

- la sostanza attiva **deltametrina** in difesa dagli attacchi di *Halymorpha halys*,
- **lo zolfo** nella lotta a Lebbra dell'olivo (*Colletotrichum spp.*);

Per la sostanza attiva deltametrina si specifica che è concessa la deroga per un solo intervento fitoiatrico.