Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA

PAROLE CHIAVE:
MOSCA OLIVO,
MATURAZIONE OLIVE

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

09-10-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Nella **prima parte della settimana il tempo si è mantenuto sereno**, mentre **nella seconda sono arrivate piogge** accompagnate **da un abbassamento delle temperature**. Le olive, che avevano iniziato a mostrare segnali di stress idrico, hanno beneficiato delle precipitazioni, tornando a un corretto stato di idratazione. **Tutte le varietà si trovano attualmente nella fase fenologica di invaiatura**.

Per quanto riguarda la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*), **la popolazione è in calo**, con una prevalenza di individui adulti. Sul fronte **mosca delle olive** *(Bactrocera oleae),* le **catture si mantengono stabili** e **su valori bassi:** non **sono state rilevate nuove punture fertili**, ma si **segnala la sporadica presenza di pupe**. Gli **indici di danno** negli oliveti monitorati evidenziano **un'infestazione attiva allo 0%** e un **danno totale rilevato al massimo dell'1%**. Le catture di adulti di **Euzophera** risultano invece **quasi azzerate**.

Nonostante le condizioni climatiche attuali siano favorevoli agli attacchi fungini, **le olive si presentano sane**. Si registrano **solo alcuni sporadici casi di tacche necrotiche**, limitati agli oliveti colpiti in precedenza dalla grandine.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Procedere a **sfalciare l'inerbimento dell'oliveto dove è necessario**

In **vista del periodo propizio per la raccolta delle olive**, è opportuno **iniziare a controllare il materiale utilizzato**, per assicurarsi che tutto sia funzionante.

Avvicinandosi la raccolta si ricorda che **per garantire la migliore qualità possibile** dell'olio prodotto è necessario **conferire le olive al frantoio entro le 24 ore dalla raccolta** in maniera che possano essere lavorate il prima possibile. È consigliabile inoltre utilizzare contenitori forati in grado di far circolare l'aria ed evitare l'utilizzo di sacchi che compattano le olive e favoriscono i processi di fermentazione che possono comportare l'insorgenza di difetti sensoriali e chimici nell' olio prodotto.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Le prove di maturazione condotte questa settimana evidenziano un aumento degli **indici colorimetrici** nel **Leccino** e nella **Casaliva**, con **parametri** che **iniziano ad avvicinarsi a quelli ottimali per la raccolta**.

Indici di Jaèn	
Leccino	**2,50-3,00**
Casaliva	**2.00**

Sono state inoltre svolte alcune **analisi sui grassi presenti** nelle **paste di oliva** su campioni di olive raccolte in **Valtenesi**.

Analisi sulla pasta di oliva		
Varietà	**Grasso (%)**	**Acidità (%)**
Leccino	**13,91-15,44**	**0,15-0,21**
Casaliva	**14,32-17,03**	**0,23-0,24**

Le percentuali rilevate variano tra il **14% e il 17%**, con **acidità molto basse**, segno di **olive di buona qualità**. Si ricorda che la resa reale è sempre inferiore all'olio presente nella pasta di oliva, **indicativamente se il grasso è 14% la resa in frantoio può essere sul 9-10 %**. Attualmente le rese delle prime partite in olio molite in frantoio si attestano sul **10%. Per le piccole aziende e gli hobbisti si consiglia di aspettare ancora almeno 7-10 giorni.**



Pupa di mosca dell'olivo-areale Garda

CONSIGLI AGRONOMICI

Sospendere i trattamenti fitosanitari.

Gli olivicoltori possono valutare di eseguire un trattamento ovo-larvicida solamente in quei campi o parcelle che verranno raccolti per ultimi e solo nel caso l'infestazione attiva di mosca dell'olivo sia sopra le soglie d'intervento.

In ogni caso nella scelta del prodotto: si raccomanda di **privilegiare quelli con il minor tempo di carenza possibile**.

MOSCA DELL'OLIVO	
TRATTAMENTI OVOLARVICIDI (al superamento della soglia 3%)	
CONVENZIONALE	**Acetamiprid, Flupyradifurone**
BIOLOGICO	**Azadiractina A**
N.B. Utilizzare i prodotti con tempo di carenza più breve possibile	

Si ricorda di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari, rispettando le dosi massime e minime d'impiego, i tempi di carenza e le modalità di applicazione.



Adulto di cimice asiatica-areale Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica dominante è quella dell'invaiatura, e inolizione**. **Il processo di maturazione** delle drupe **prosegue** con **intensità variabile in funzione della cultivar**, dell'esposizione e delle condizioni dei singoli appezzamenti. Il viraggio di colore risulta progressivamente più evidente, mentre **continua l'accumulo di olio nella polpa**.

Rispetto alle settimane precedenti, i monitoraggi effettuati negli oliveti del Sebino e della Franciacorta evidenziano un **aumento delle catture di adulti di mosca dell'olivo**.

I campionamenti diretti delle drupe mostrano tuttavia **una scarsa presenza di ovideposizioni e un'infestazione attiva generalmente contenuta**. Nella maggior parte degli oliveti monitorati **non risulta pertanto ancora raggiunta la soglia che giustifica un intervento ovo-larvicida**. La situazione richiede comunque attenzione, poiché le condizioni climatiche autunnali possono continuare a favorire l'attività della mosca e nuove ovideposizioni.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Nel **corso della settimana** sono state effettuate anche **prove qualitative sulle olive**, attraverso **misurazioni dinamometriche della resistenza allo stacco delle drupe** e **della resistenza alla penetrazione della polpa**, utili **per valutare l'evoluzione della maturazione**. Le prove eseguite il 6 ottobre a Tavernola Bergamasca su nove cultivar hanno evidenziato valori di resistenza allo stacco compresi tra 307 e 508 g e di resistenza alla penetrazione compresi tra 178 e 365 g, con differenze significative tra le varietà.

Misurando la forza necessaria per staccare le olive e per penetrare la polpa, **si vuole capire quando è il momento giusto per raccoglierle**; i primi dati mostrano valori diversi tra le varietà e serviranno come riferimento per i prossimi controlli.

CONSIGLI AGRONOMICI

È importante **proseguire con un monitoraggio frequente delle trappole**, verificando l'evoluzione delle catture, e intensificare il **campionamento diretto delle olive**. Nei campioni è necessario distinguere le punture sterili da quelle fertili e **verificare soprattutto la presenza di uova e larve vive di prima età**, così da d**eterminare l'effettiva percentuale di infestazione attiva** e seguirne l'evoluzione.

Per la difesa ovo-larvicida, la sporadica presenza di larve di prima età rende particolarmente importante **valutare l'infestazione attiva nei singoli oliveti**. Eventuali interventi non devono essere generalizzati, ma decisi sulla base dei risultati dei campionamenti e delle soglie previste dai disciplinari.

Considerata la fase avanzata della stagione e il **progressivo avvicinamento alla raccolta**, l'eventuale utilizzo di prodotti autorizzati a base di **acetamiprid o flupyradifurone** dovrà **essere attentamente valutato** verificando tempi di carenza, numero massimo di applicazioni consentite e data prevista di raccolta.

In questa fase si consiglia inoltre di privilegiare, ove possibile, **i prodotti con il tempo di carenza più breve**, così da **garantire un margine di sicurezza maggiore rispetto alla raccolta e ridurre il rischio di superare i limiti di residuo consentiti**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella della **maturazione**.

Le olive procedono in modo progressivo verso la maturazione, in molti areali precoci il momento è ideale per la raccolta. Rispetto allo scorso anno la stagione è leggermente in anticipo.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Se non fosse ancora stato fatto si consiglia di sfalciare il **cotico erboso**, per l'inizio della raccolta.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda in fase di raccolta di **sospendere tutti i trattamenti fitosanitari**.
Nel post raccolta è consigliabile effettuare un **trattamento contro i patogeni fungini**, come occhio di pavone, lebbra e piombatura. I prodotti da utilizzare possono essere **rame e zolfo** nel campo del **biologico** (trattamento preventivo), in alternativa, per **la difesa integrata, dodina o tebuconazolo**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerali/imprese-olivicole.