Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA-MATURAZIONE

PAROLE CHIAVE:
MOSCA OLIVO, INIZIO RACCOLTA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

16-10-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Settimana caratterizzata da **tempo sereno** con il passaggio di alcune nubi, **le temperature** sono state **nella media del periodo** con **forte escursione termica tra il giorno e la notte**. **La fase fenologica** rilevata in campo **è invaiatura per tutte le varietà** e si segnala che **le drupe delle varietà precoci sono quasi del tutto invaiate.**

Per quanto riguarda la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*), **la popolazione è in calo**, con una prevalenza di individui adulti che con l'abbassamento delle temperature cominciano a spostarsi verso i ripari invernali.

Sul fronte **mosca delle olive** *(Bactrocera oleae),* le **catture sono ancora stabili** e **su valori bassi:** non **sono state rilevate nuove punture fertili**, ma si **segnala la sporadica presenza di pupe**. Gli **indici di danno** negli oliveti monitorati evidenziano **un'infestazione attiva sotto alla soglia d'intervento**. Le catture di adulti di **Euzophera** restano anche questa settimana vicine agli 0 individui.

Al momento le olive si presentano sane. Restano **solo alcuni sporadici casi di tacche necrotiche**, limitati agli oliveti colpiti in precedenza dalla grandine.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

È possibile **iniziare le operazioni di raccolta**.

Procedere a **sfalciare l'inerbimento dell'oliveto dove è necessario**

Si ricorda che **per garantire la migliore qualità possibile** dell'olio prodotto è necessario **conferire le olive al frantoio entro le 24 ore dalla raccolta** in maniera che possano essere lavorate il prima possibile.
È consigliabile inoltre **utilizzare contenitori forati in grado di far circolare l'aria** ed evitare l'utilizzo di sacchi che compattano le olive e favoriscono i processi di fermentazione che possono comportare l'insorgenza di difetti sensoriali e chimici nell' olio prodotto. Date le **temperature elevate** che possono essere raggiunte nelle **ore centrali della giornata**, si consiglia di **non lasciare le olive raccolte al sole** ma di **collocarle in zone ombreggiate** per evitare che si scaldino.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica var. Leccino-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Le prove di maturazione condotte questa settimana evidenziano un aumento degli **indici colorimetrici** nel **Leccino** e nella **Casaliva**, con **parametri** che **iniziano ad avvicinarsi a quelli ottimali per la raccolta**.

Indici di Jaèn	
Leccino	**3,00-3,30**
Casaliva	**2,10-2,50**

I primi dati relativi alle partite di olive molite questa settimana indicano, per l'**Alto Garda**, rese variabili **tra il 12% e il 15%**, mentre per la **Valtenesi** si attestano **attorno al 10%**. Va comunque ricordato che **la resa in olio può variare notevolmente anche tra oliveti situati nella stessa zona**.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica var. Casaliva-areale Garda

Sospendere i trattamenti fitosanitari.

Gli olivicoltori possono valutare di eseguire un trattamento ovo-larvicida solamente in quei campi o parcelle che verranno raccolti tardivamente indicativamente dai primi di novembre e solo nel caso l'infestazione attiva di mosca dell'olivo sia sopra le soglie d'intervento.

Si raccomanda comunque di **privilegiare quelli con il minor tempo di carenza possibile**.

MOSCA DELL'OLIVO	
TRATTAMENTI OVOLARVICIDI (al superamento della soglia 3%)	
CONVENZIONALE	**Acetamiprid, Flupyradifurone**
BIOLOGICO	**Azadiractina A**
N.B. Utilizzare i prodotti con tempo di carenza più breve possibile	

Si ricorda di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari, rispettando le dosi massime e minime d'impiego, i tempi di carenza e le modalità di applicazione.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Pupa di mosca dell'olivo-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica dominante è quella dell'invaiatura, e inolizione**. **Il processo di maturazione** delle drupe **prosegue** con **intensità variabile in funzione della cultivar**, dell'esposizione e delle condizioni dei singoli appezzamenti. Il **viraggio di colore risulta progressivamente più evidente**, mentre continua l'accumulo di olio nella polpa. **Negli oliveti** e nelle **cultivar più precoci**, il grado di **maturazione raggiunto** consente di iniziare a **valutare l'avvio delle operazioni di raccolta**, tenendo conto delle caratteristiche varietali e dello stato fitosanitario delle drupe.

Dal punto di vista fitosanitario, si registra un **progressivo aumento dell'attività della mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*). Rispetto alla settimana precedente, i monitoraggi effettuati negli oliveti del Sebino e della Franciacorta evidenziano un **incremento delle catture di adulti**, accompagnato da un a**umento della percentuale di infestazione delle drupe** rilevata attraverso i campionamenti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Considerato l'**avanzamento della maturazione** e il **progressivo aumento dell'attività della mosca dell'olivo**, si consiglia di **valutare l'avvio delle operazioni di raccolta**, in particolare negli oliveti più precoci e negli appezzamenti nei quali i campionamenti evidenziano una maggiore presenza del fitofago.

Si raccomanda infine di **raccogliere olive sane**, **evitando** per quanto possibile **i frutti caduti a terra o fortemente danneggiati**, e di **conferire le olive al frantoio nel più breve tempo possibile**, preferibilmente **entro 24 ore dalla raccolta**, conservandole nel frattempo in cassette aerate e in ambienti freschi, per preservare le caratteristiche qualitative dell'olio.

CONSIGLI AGRONOMICI

Negli oliveti nei **quali la raccolta non è ancora prevista a breve termine**, è importante **proseguire con il monitoraggio delle trappole e il campionamento diretto delle olive**, verificando in particolare la presenza di uova, larve vive e gallerie nella polpa.

Per la difesa ovo-larvicida, si raccomanda sempre di **valutare l'infestazione attiva nei singoli oliveti**. Eventuali interventi non devono essere generalizzati, ma decisi sulla base dei risultati dei campionamenti e delle soglie previste dai disciplinari.

Per gli oliveti che verranno raccolti tardivamente, l'eventuale utilizzo di prodotti autorizzati a base di **acetamiprid o flupyradifurone** dovrà **essere attentamente valutato** verificando tempi di carenza, numero massimo di applicazioni consentite e data prevista di raccolta.

Nel caso siano necessari interventi è fondamentale **privilegiare i prodotti con il tempo di carenza più breve possibile**, così da **garantire un margine di sicurezza maggiore rispetto alla raccolta e ridurre il rischio di superare i limiti di residuo consentiti**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella della **maturazione**.

Attualmente non **si registrano particolati criticità fitosanitarie**, **le olive proseguono** con **la maturazione**.

Si consiglia di **continuare la raccolta**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per ottenere un **olio della migliore qualità possibile**, ricordiamo che **le olive vanno** conferite **al frantoio entro 24 ore dalla raccolta**, in modo da essere lavorate il prima possibile.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda in fase di raccolta di **sospendere tutti i trattamenti fitosanitari**.
Nel post raccolta è consigliabile effettuare un **trattamento contro i patogeni fungini**, come occhio di pavone, lebbra e piombatura. I prodotti da utilizzare possono essere **rame e zolfo** nel campo del **biologico** (trattamento preventivo), in alternativa, per **la difesa integrata, dodina o tebuconazolo**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerali/imprese-olivicole.

PER CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNALA QUESTO EVENTO A SAN FELICE TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONTENUTE NELLA LOCANDINA ALLEGATA:

