Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

INVAIATURA-MATURAZIONE

PAROLE CHIAVE:
MOSCA OLIVO, RACCOLTA

"Monitoraggio assistenza tecnica, formazione e diffusione di buone pratiche per la salvaguardia dell'olivicoltura nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como e Lecco "

BOLLETTINO OLIVO

23-10-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

La **settimana** è stata segnata dal **passaggio di diverse perturbazioni**, con un **calo** sia delle **temperature minime** che di quelle **massime**, pur mantenendo una **spiccata escursione termica tra il giorno e la notte**. Dal punto di vista fenologico, **tutte le varietà si trovano in fase di invaiatura**; in particolare, le drupe delle **varietà precoci hanno ormai quasi completato il processo**.

Per quanto riguarda la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*), la **popolazione risulta in calo** con **presenze solo sporadiche**. Il progressivo abbassamento delle temperature ha infatti spinto gli insetti a iniziare lo spostamento verso i ripari invernali. Per quanto riguarda **mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*), le **catture si mantengono stabili e su valori bassi**, sebbene **siano state riscontrate nuove punture fertili**. Negli oliveti monitorati **l'infestazione attiva** raggiunge **in alcuni casi il 5%**. Si evidenzia tuttavia che **le attuali temperature rallentano notevolmente lo sviluppo larvale**, **allungando i tempi necessari al completamento del ciclo vitale** rispetto al periodo estivo.

Al momento le olive si presentano sane, anche se le condizioni ambientali sono favorevoli agli attacchi fungini.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Continuare **le operazioni di raccolta**.

Procedere a **sfalciare l'inerbimento dell'oliveto dove è necessario**

Si ricorda che **per garantire la migliore qualità possibile** dell'olio prodotto è necessario **conferire le olive al frantoio entro le 24 ore dalla raccolta** in maniera che possano essere lavorate il prima possibile.
È consigliabile inoltre **utilizzare contenitori forati in grado di far circolare l'aria** ed evitare l'utilizzo di sacchi che compattano le olive e favoriscono i processi di fermentazione che possono comportare l'insorgenza di difetti sensoriali e chimici nell' olio prodotto. Si consiglia di **non lasciare le olive raccolte al sole** ma di **collocarle in zone ombreggiate** per evitare che si scaldino, aumentando le possibilità di fermentazioni anomale che possono causare difetti sensoriali nell'olio prodotto.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica var. Leccino-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Le prove di maturazione di questa settimana evidenziano un aumento degli **indici colorimetrici** nel **Leccino** e nella **Casaliva**, con **parametri** che **hanno raggiunto quelli ottimali per la raccolta**.

Indici di Jaèn	
Leccino	**3,53-3,72**
Casaliva	**2,32-2,44**

I primi dati relativi alle partite di olive molite questa settimana indicano, per l'**Alto Garda**, rese variabili **tra il 11% e il 14%**, mentre per la **Valtenesi** le rese medie si attestano **attorno al 10-12%**.

Le rese attualmente sono molto variabili e sono molto legate alle specifiche aree e agli specifici oliveti.



Fase fenologica var. Casaliva-areale Garda

CONSIGLI AGRONOMICI

Sospendere i trattamenti fitosanitari.

Gli olivicoltori possono valutare di eseguire un trattamento ovo-larvicida solamente in quei campi o parcelle che verranno raccolti tardivamente indicativamente verso la metà di novembre e solo nel caso l'infestazione attiva di mosca dell'olivo sia sopra le soglie d'intervento. Si raccomanda di **privilegiare quelli con il minor tempo di carenza possibile**.

Di seguito uno schema riassuntivo:

MOSCA DELL'OLIVO	
TRATTAMENTI OVOLARVICIDI (al superamento della soglia 3%)	
CONVENZIONALE	**Acetamiprid, Flupyradifurone**
BIOLOGICO	**Azadiractina A**
N.B. Utilizzare i prodotti con tempo di carenza più breve possibile	



uovo di mosca dell'olivo-areale Garda

Una volta completate le operazioni di raccolta è utile effettuare **un intervento fitosanitario** distribuendo prodotti ad **azione fungicida e batteriostatica** a tutta chioma, contro rogna dell'olivo e come profilassi contro le infezioni da occhio di pavone. A tal scopo si consigliano i **prodotti rameici.**

TRATTAMENTI ANTIFUNGINI DA EFFETTUARE IN POST-RACCOLTA
Prodotti rameici (Poltiglia bordolese, Ossicloruro di rame, Solfato di rame e l'Idrossido di rame)

Si ricorda di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta dei prodotti fitosanitari, rispettando le dosi massime e minime d'impiego, i tempi di carenza e le modalità di applicazione.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti del Sebino e della Franciacorta la **fase fenologica dominante è quella dell'invaiatura, e inolizione**. **Il processo di maturazione** delle drupe **prosegue** con **intensità variabile in funzione della cultivar**, dell'esposizione e delle condizioni dei singoli appezzamenti. Il **viraggio di colore risulta progressivamente più evidente**, mentre continua l'accumulo di olio nella polpa. Il **grado di maturazione raggiunto** in buona parte degli oliveti **consente** ormai **di avviare le operazioni di raccolta**, tenendo conto delle caratteristiche varietali e dello stato fitosanitario delle drupe.

Dal punto di vista **fitosanitario**, l**a situazione risulta sostanzialmente invariata** rispetto alla settimana precedente. Il recente **abbassamento delle temperature** ha determinato un **rallentamento dell'attività di volo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)**. **Permane** tuttavia **la presenza di infestazioni nelle drupe**. Il rallentamento dei voli non esclude infatti la prosecuzione dello sviluppo delle forme larvali già presenti all'interno delle olive, sebbene le temperature più basse possano rallentarne l'evoluzione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Considerato l'avanzamento della **maturazione** e la **situazione fitosanitaria**, si consiglia di **iniziare le operazioni di raccolta** negli oliveti del Sebino e della Franciacorta.

L'avvio della raccolta rappresenta in questa fase **una strategia agronomica importante** per **preservare la qualità dell'olio** e **limitare i possibili danni derivanti dall'evoluzione delle infestazioni**, evitando di prolungare eccessivamente la permanenza delle olive sulle piante.

Si raccomanda infine di **raccogliere olive sane**, **evitando** per quanto possibile **i frutti caduti a terra o fortemente danneggiati**, e di **conferire le olive al frantoio nel più breve tempo possibile**, preferibilmente **entro 24 ore dalla raccolta**, conservandole nel frattempo in cassette aerate e in ambienti freschi, per preservare le caratteristiche qualitative dell'olio.

CONSIGLI AGRONOMICI

Sospendere i trattamenti fitosanitari.

In questa fase i **trattament**i potrebbero essere **giustificati solo negli oliveti** nei **quali si prevede di effettuare una raccolta particolarmente tardiva**, per queste parcelle si consiglia di **proseguire con il monitoraggio delle trappole e il campionamento diretto delle olive**, verificando in particolare la presenza di uova, larve vive e gallerie nella polpa.

Per la difesa ovo-larvicida, si raccomanda sempre di **valutare l'infestazione attiva nei singoli oliveti**. Eventuali interventi non devono essere generalizzati, ma decisi sulla base dei risultati dei campionamenti e delle soglie previste dai disciplinari. Nel caso siano necessari interventi è fondamentale **privilegiare i prodotti con il tempo di carenza più breve possibile**, così da **garantire un margine di sicurezza maggiore rispetto alla raccolta e ridurre il rischio di superare i limiti di residuo consentiti**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella della **maturazione**.

Attualmente non **si registrano particolati criticità fitosanitarie**, **le olive proseguono** con **la maturazione**.

Si consiglia di **continuare la raccolta**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per ottenere un **olio della migliore qualità possibile**, ricordiamo che **le olive vanno** conferite **al frantoio entro 24 ore dalla raccolta**, in modo da essere lavorate il prima possibile.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si ricorda in fase di raccolta di **sospendere tutti i trattamenti fitosanitari**.
Nel post raccolta è consigliabile effettuare un **trattamento contro i patogeni fungini**, come occhio di pavone, lebbra e piombatura. I prodotti da utilizzare possono essere **rame e zolfo** nel campo del **biologico** (trattamento preventivo), in alternativa, per **la difesa integrata, dodina o tebuconazolo**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerali/imprese-olivicole.

PER CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNALA QUESTO EVENTO A SAN FELICE TUTTE LE INFORMAZIONI SONO CONTENUTE NELLA LOCANDINA ALLEGATA:

